

PROMUEVE



AVALA



COLABORA



Formación presencial en Vigo

Dispensación de medicamentos

Caso 4

CASO 4

Paciente:

Hombre, 76 años. Sobrepeso.

En tratamiento con:

Metformina 850 mg (1-1-1).

Glimepirida 2 mg (0-1-1).

Insulina glargina (22-0-0).

Irbesartán/HCTZ 300/12,5 mg (1-0-0).

Acude a la farmacia para retirar su medicación habitual y realizar controles de salud. Toma los ADO desde hace años y utiliza insulina desde hace 8 meses. Conoce bien la medicación pero las cifras de glucemia sobrepasan los 220 mg/dl. No tiene hipoglucemias. Toma el antihipertensivo desde hace 4 meses, cumple bien. Se le toma la tensión (130/80 mmHg) y se determina el colesterol total (280 mg/dl).



CASO 4

Evaluación

- Inefectividad no cuantitativa de los ADO
- Necesidad de medicamento (estatina) para el PS Hipercolesterolemia
- Necesidad de medicamento AAS para disminuir el RCV



CASO 4

Intervención

- Dispensación de los medicamentos prescritos
- Informar al paciente de la necesidad de bajar de peso con ejercicio y hábitos higiénicos adecuados
- Proponerle la incorporación al programa de SFT



CASO 4

Plan de seguimiento

- A la vista de los resultados del seguimiento, informar al médico, por escrito, de la necesidad de retirar la SU e instaurar insulinoterapia intensiva
- Informar al médico, por escrito, de la necesidad de estatina y AAS

