

PROMUEVE



AVALA



COLABORA




Formación presencial en Vigo

Indicación farmacéutica

Caso 3

Mujer de 66 años, IMC de 42, solicita en la farmacia tratamiento para la diarrea. Refiere estar “mal del reuma” y que hace dos días el especialista le recetó ácido mefenámico para la inflamación de una rodilla. Desde entonces tiene diarrea, se encuentra bastante aturdida y somnolienta. No ha variado su dieta habitual. Toma también los siguientes medicamentos:


- Telmisartán 80 mg (1-0-0)
- Moxonidina 0,2 mg (0-1-0)
- Daonil 5 mg (1-1-1)



Buenos días, deme algo para la diarrea

1ª Pregunta

- a) ¿Qué síntomas tiene?
- b) ¿Es para Usted?
- c) ¿Ha vomitado?
- d) ¿Cuántas veces al día va al WC?



Buenos días, deme algo para la diarrea

1ª Pregunta

a) ¿Qué síntomas tiene?

b) ¿Es para Usted?

c) ¿Ha vomitado?

d) ¿Cuántas veces al día va al WC?



Respuesta

Si

(El farmacéutico observa que tiene una edad entre 60 y 70 años)




2ª Pregunta

- a) ¿Ha perdido peso recientemente?
- b) ¿Qué síntomas tiene?
- c) ¿Qué medicamentos toma?
- d) ¿Tiene alergias?



2ª Pregunta

- a) ¿Ha perdido peso recientemente?
- b) ¿Qué síntomas tiene?**
- c) ¿Qué medicamentos toma?
- d) ¿Tiene alergias?




Respuesta

Tiene diarrea intensa, se encuentra bastante aturdida y somnolienta. No ha variado su dieta habitual.



3ª Pregunta

- a) **¿Desde cuándo nota los síntomas?**
- b) ¿Le impide trabajar?
- c) Debe hacer reposo en casa
- d) ¿Tiene estornudos?



Respuesta

Desde hace 2 días



4ª Pregunta

- a) ¿Tiene mucha sed?
- b) ¿Tiene dificultades para tragar?
- c) ¿Padece alguna enfermedad crónica o toma algún medicamento?
- d) Debe consultar al médico



4ª Pregunta

- a) ¿Tiene mucha sed?
- b) ¿Tiene dificultades para tragar?
- c) ¿Padece alguna enfermedad crónica o toma algún medicamento?**
- d) Debe consultar al médico




Respuesta

Refiere estar “mal del reuma” y que hace dos días el especialista le recetó ácido mefenámico para la inflamación de una rodilla. Toma también los siguientes medicamentos:

Telmisartán 80 mg (1-0-0)

Moxonidina 0,2 mg (0-1-0)

Daonil 5 mg (1-1-1)



5ª Pregunta

- a) ¿Puede trabajar?
- b) ¿Alguna alergia o condición especial?
- c) ¿Se marear?
- d) ¿Practica deporte?



5ª Pregunta

a) ¿Puede trabajar?

b) ¿Alguna alergia o condición especial?

c) ¿Se marear?

d) ¿Practica deporte?



Respuesta

Cree que no.

Obesidad mórbida.



6ª Pregunta

a) ¿Tenemos suficiente información para decidir cómo actuar?

Si

No



6ª Pregunta

a) ¿Tenemos suficiente información para decidir cómo actuar?

Si

No



Evaluación

La diarrea intensa, el aturdimiento y la y somnolencia parecen causados por la toma de ácido mefenámico, pues tanto las reacciones adversas recogidas en la ficha técnica como el comienzo de la toma coinciden. Al haber sido prescrito por el médico es éste quien debe valorar su posible retirada o cambio.



Intervención

a) ¿Qué medicamento/os y/o medida no farmacológica se le podría indicar?

<input type="checkbox"/> Loperamida+ dimeticona	<input type="checkbox"/> No comer nada en todo el día	<input type="checkbox"/> Pasear después de cenar
<input type="checkbox"/> Beber mucha cola	<input type="checkbox"/> Hojas de sen	<input type="checkbox"/> Hacer ayuno total
<input type="checkbox"/> Debe ir al médico	<input type="checkbox"/> Debe tomar leche entera	<input type="checkbox"/> Loperamida
<input type="checkbox"/> Estreptomicina	<input type="checkbox"/> Debe pasear más	<input type="checkbox"/> Hacer reposo total



Intervención

a) ¿Qué medicamento/os y/o medida no farmacológica se le podría indicar?

<input type="checkbox"/> Loperamida+ dimeticona	<input type="checkbox"/> No comer nada en todo el día	<input type="checkbox"/> Pasear después de cenar
<input type="checkbox"/> Beber mucha cola	<input type="checkbox"/> Hojas de sen	<input type="checkbox"/> Hacer ayuno total
<input checked="" type="checkbox"/> Debe ir al médico	<input type="checkbox"/> Debe tomar leche entera	<input type="checkbox"/> Loperamida
<input type="checkbox"/> Estreptomicina	<input type="checkbox"/> Debe pasear más	<input type="checkbox"/> Hacer reposo total



Seguimiento

Tras la visita al médico se le dispensará el nuevo antiinflamatorio y/o los demás medicamentos que le prescriba, se comprobará la mejoría de la diarrea y se evaluará la efectividad y seguridad de todos los medicamentos.

Se le propondrá un programa de pérdida de peso.

